



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**HELLENIC CARDIOLOGICAL SOCIETY**

**36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  
(ΔΙΕΘΝΕΣ)  
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  
ΣΥΝΕΔΡΙΟ**

**29-31/10/2015**

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**


**36th PANHELLENIC  
(INTERNATIONAL)  
CONGRESS OF  
CARDIOLOGY**

**29-31/10/2015**

MAKEDONIA PALACE HOTEL

**THESSALONIKI / GREECE**


**ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**



# ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΕ 2015

- Πρόεδρος : Πέτρος Γ. Καλογερόπουλος
- Αντιπρόεδρος : Σωτηρία Λυμπέρη
- Πυρήνας : Βασιλική Γιαννακοπούλου  
Γεώργιος Γκουμάς,, Δημήτρης Ρίχτερ  
Κώστας Δάβος ,Τάκης Ξυδάς

# INTERHEART: 9 τροποποιήσιμοι παράγοντες ευθύνονται για το 90% του κινδύνου πρωτογενούς ΕΜ, παγκοσμίως




N = 15,152 patients and 14,820 controls in 52 countries

PAR = population attributable risk, adjusted for all risk factors

Yusuf S et al. *Lancet*. 2004;364:937-52.


# Smoking: The Leading Risk Factor for Disease and Disability in Developed Countries...

Overall, 12% of all disease burden in developed countries is associated with tobacco use




# ... And An Increasing Problem in Low Mortality Developing Countries

**Tobacco is the third greatest risk factor for disability in developing countries**



1 DALY = Loss of 1 year of equivalent full health  
World Health Organization, 2002



# 36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 20- 31/10/2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Νέα φάρμακα που μειώνουν την χοληστερίνη και δεν είναι στατίνες

Τα τριγλυκερίδια αποτελούν θεραπευτικό στόχο??

Κλινική σημασία του σακχαρώδη διαβήτη , ο οποίος εμφανίζεται μετά την χρήση στατινών!!

Στατίνες στην πρωτογενή πρόληψη σε ποιούς και γιατί.

Σύγχρονες αντιλήψεις για την διακοπή του καπνίσματος , με την βοήθεια φαρμακευτικών μέσων


Ηλεκτρονικό τσιγάρο ένα εργαλείο διακοπής του καπνίσματος, ή θα μετατραπεί σε Δούρειο ίππο έθισμού των εφήβων στο κάπνισμα

Πολλά θέματα εθίγησαν στα προβλήματα που δημιουργεί η υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης

Δοκιμασία κόπωσης, καρδιοαναπνευστική δοκιμασία



# INTERHEART: 9 τροποποιήσιμοι παράγοντες ευθύνονται για το 90% του κινδύνου πρωτογενούς ΕΜ, παγκοσμίως



N = 15,152 patients and 14,820 controls in 52 countries

PAR = population attributable risk, adjusted for all risk factors

Yusuf S et al. *Lancet*. 2004;364:937-52.