

Debate

Έναρξη θεραπείας με βασική
ινσουλίνη σε ασθενείς με ΣΔτ2.

Πόσο gold είναι το standard

Dr Δέσποινα Καραγιάννη

Παθολόγος-διαβητολόγος

τ. Διευθύντρια ΕΣΥ

*Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη
Διαβήτη*



Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων

Έχω λάβει honoraria για συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαλέξεις από τις Φαρμακευτικές εταιρείες:

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, ΕΛΠΕΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜ, ΜΥΛΑΝ



κυρία Όλγα:

Ασθενής με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2

- Διεγνώσθη πριν 12 χρόνια
- 62 ετών, εργαζόμενη
- **HbA_{1c}: 8,2%**
- BMI 26,5
- Σε αγωγή με: έτοιμο συνδυασμό βιλνταγλιπτίνης 50 mg & μετφορμίνης 1.000 mg, εμπαγλιφλοζίνη 10 mg
- Καλή νεφρική λειτουργία



Έναρξη θεραπείας με βασική ινσουλίνη

Σύμφωνα με τον θεραπευτικό αλγόριθμο 2016, η βασική ινσουλίνη προστίθεται στο 2^ο, 3^ο και 4^ο θεραπευτικό βήμα, καθώς η λεγόμενη «κλινική αδράνεια» οδηγεί σε συσσώρευση γλυκαιμικού φορτίου που έχει ως αποτέλεσμα, μέσω και της μεταβολικής μνήμης, στην εμφάνιση των επιπλοκών



Έναρξη θεραπείας με βασική ινσουλίνη

Ποια βασική ινσουλίνη;

Τα ανάλογα βασικής ινσουλίνης προσέφεραν τεράστιο όφελος στην ρύθμιση των διαβητικών, ελαττώνοντας τα υπογλυκαιμικά επεισόδια και την αύξηση βάρους, «αποδαιμονοποιώντας» ουσιαστικά την ινσουλίνη

Glargine U100

vs

Glargine U300

Degludec



Θέλουμε μια ινσουλίνη:

- *Αποτελεσματική*
- *Ασφαλή* (Υπογλυκαιμίες-Καρδιαγγειακή ασφάλεια)
- *Απλή στην χρήση* για καλύτερη συμμόρφωση
- *Με καλή σχέση κόστους - οφέλους*

Debate

A. Κόκκινος

- Αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΓΝ «Λαϊκό»

Σ. Λιάτης

- Παθολόγος με Εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, επιμελητής Α ΕΣΥ, Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα